

## Samenhang hyperacusis met andere aandoeningen

binnenoor slechthorendheid
ziekte van Ménière
lawaaidoofheid
opgelopen door hoofdletsel
ontstaan door onvoorzichtig uitspuiten van het oor
t.g.v. het gebruik van medicijnen
fibromyalgie
geurgevoeligheid
HSP = Highly Sensitive Persons
abnormale vochtophoping in het binnenoor
Cranio Mandibular Dysfunctie = CMD
problemen na stapedectomie (verwijdering van de stijgbeugel en wordt vervangen door een prothese)
Bell's Parese (aangezichtsverlamming)
Hersenbloeding
Herpes Zoster
Myastenia Gravis (ernstige vorm van spierzwakte)
Epilepsie
Migraine
Cerebrospinale hypotonie (onvoldoende spanning van de spieren in het hersen/ruggemergebied)
MS
Spina bifida (open ruggetje)
Ziekte van Lyme
Auditieve verwerkings/waarnemeningstoringen
Aandachtsstoornissen, w.o. ADHD
Primaire ziekte van de Thalamus > deel van de tussenhersenen met een belangrijke functie in het ordenen en verwerken van allerlei (zintuig)prikkels

Storing van de serotonine-receptoren in de hersenen > serotonine is een stof in de hersenen die betrokken is bij allerlei processen in o.m. de vecht- en vluchtfunctie: vernauwt de bloedvaten; een tekort kan te maken hebben met het ontstaan van een depressie; emotie
Autisme
Onderdeel van een syndroom bij gesloten hersenletsel;
Posttraumatische stressstoornis
Gevoeligheid van LFG/UMTS
Depressie
Angstneurose
Persoonlijkeitsstoornis
Manie
Schizofrenie
Williams syndroom
Cogan-syndroom (interstitiële keratitis met Tinnitus, duizeligheid en progressieve doofheid > ontsteking van het hoornvlies in de tussenruimte in het oog)
Tay Sachs syndroom
Gangliosidosis (stapelingsziekte in de hersenen of andere weefsels vanwege enzymtekorten)
Syndroom van Down
Syndroom van Sicca/ Sjögren
Acrodynie: schilferige handen, pijnlijke handen en voetzolen met tintelingen, prikkelingen en roodheid; soms met krachtverlies in armen en benen; spijsverteringstoornissen.
SCD-syndroom: evenwichts- en gehoorstoornis t.g.v. een opening in het bot boven het bovenste evenwichtskanaal, het zogenaamde Superior Canal. Het treedt meestal op tussen het 35 <sup>ste</sup> en 55 <sup>ste</sup> levensjaar.
Bijna-dood-ervaringen en/of uittredingsverschijnselen

